

CETROTIDE

1. Lávese las manos. Es importante que sus manos y todos los elementos que utilice estén lo más limpios posible.
2. Coloque sobre una superficie limpia todo lo necesario (el frasco ampula con el medicamento, la jeringa precargada, una aguja de inyección con una marca amarilla, una aguja de inyección con una marca gris y dos torundas).
3. Retire la tapa de plástico del frasco ampula. Limpie el aro de aluminio y el tapón de caucho con torunda de alcohol.
4. Tome la aguja de inyección con la marca amarilla y retire la envoltura. Tome la jeringa prellenada y retire la cubierta. Ponga la aguja en la jeringa y retire la cubierta de la aguja.
5. Haga penetrar la aguja por el centro del tapón de caucho del frasco ampula empujando lentamente el émbolo de la jeringa.
6. Deje la jeringa en el frasco ampula. Suavemente agite el frasco ampula hasta que la solución quede límpida y sin residuos. Evite la formación de burbujas durante la disolución.
7. Haga pasar todo el contenido del frasco ampula a la jeringa. Si queda solución en el frasco ampula, invierta el frasco y retire la aguja hasta que la apertura de la aguja quede justo dentro del tapón. Si mira de costado a través del espacio vacío en el tapón, puede controlar el movimiento de la aguja y del líquido. Es importante retirar el contenido íntegro del frasco ampula.
8. Separe la jeringa de la aguja y deposite la jeringa. Tome la aguja de inyección con la marca gris y retire su envoltura. Ponga la aguja en la jeringa y retire la cubierta de la aguja.
9. Invierta la jeringa y empuje el émbolo hasta expeler todas las burbujas de aire. No toque la aguja ni permita que la aguja toque ninguna superficie.
10. Elija un lugar donde inyectar en la pared de la zona inferior del abdomen, preferentemente alrededor del ombligo. Tome la segunda torunda y limpie la piel en el lugar de inyección. Sostenga la jeringa con una mano. Tome suavemente en pliegue de piel alrededor del lugar donde inyectar y sostenga firmemente con la otra mano.
11. Sostenga la jeringa como si fuera un lápiz e introduzca la aguja por completo en la piel con un ángulo de aproximadamente 45 grados.
12. Una vez que la aguja esté introducida por completo, suelte la piel.
13. Jale suavemente el émbolo de la jeringa. Si aparece sangre, continúe según lo indicado en el paso 14. Si no aparece sangre, inyecte la solución lentamente empujando el émbolo con suavidad. Una vez que haya inyectado la solución, retire la aguja lentamente, haciendo presión suavemente con la torunda sobre el lugar de la piel donde se introdujo la aguja. Retire la aguja en el mismo ángulo en el que la introdujo.
14. Si aparece sangre, retire la aguja con la jeringa y haga presión suavemente en el lugar de la inyección. No utilice esta solución y vacíe la jeringa en un lavabo.
15. Use la jeringa y las agujas solo una vez. Deshágase de la jeringa y de las agujas en cuanto las haya utilizado (ponga las cubiertas sobre las agujas para no lastimarse).